Universitat d'Alacant Universidad de Alicante	**SECUENCIACIÓN DNA** Recepción de muestras – Usuarios externos Servicios Técnicos de Investigación	

FECHA SOLICITUD	FECHA PREVISTA ANÁLISIS	FECHA ANÁLISIS

CARACTERÍSTICA DE LA MUESTRA

Muestra tóxica: ☐ SI ☐ NO ☐ Desconocida

DATOS DEL ENSAYO

(no rellenar los campos sombreados)

Nº	DNA			Cebador			Programa PCR	Observaciones	RD
	Nombre	[ ] / vol	Plásm, Fago, pr. PCR...	Nombre	[ ] / vol	Tm			

NOTA: Cuando se disponga, adjuntar ficha/s de seguridad de la/s muestra/s

REQUISITOS PARA EL ANÁLISIS:

- La muestra de DNA y Cebador debe suministrarse conjuntamente en un tubo tipo Eppendorf de 0.5mL. con tapón de rosca y sellado con Parafilm, proporcionando:

	Concentración mínima	Cantidad mínima
DNA producto PCR	50 ng./μL.	100-200 ng.
DNA Clonado	200 ng./μL.	1.00-2.00 μg.
		1.50-3.00 μg.
CEBADOR		3.2 /12 pmol.
H_2O ultrapura		Hasta 6 μL. Volumen final

- Los productos PCR deben ser purificados antes de la amplificación de secuenciación y cuantificados después de su purificación.